



# CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

14, rue Émile-Noirot - 42300 ROANNE

☎ 04 77 71 78 93

## La gestation chez la chienne

La durée de la gestation chez la chienne peut varier de 57 à 70 jours à partir de la saillie.

### Saillie

Il est préférable que le mâle et la femelle se connaissent déjà. Idéalement, le mâle va chez la femelle pour deux saillies à 48 heures d'intervalle. La période la plus propice se situe entre le 9<sup>ème</sup> et le 13<sup>ème</sup> jour après le début des chaleurs.

### Diagnostic

#### Palpation abdominale

C'est une technique intéressante vers 30 jours de gestation. Elle s'avère cependant difficile, notamment chez les chiennes obèses ou stressées.

#### Radiographie

Elle se fait à partir du 55<sup>ème</sup> jour de gestation. Elle permet de déterminer la taille de la portée.

#### Echographie

Elle peut être réalisée dès le 30<sup>ème</sup> jour de gestation. Le comptage des chiots est difficile avec cette technique, mais elle permet de dire si les chiots sont vivants.

## Soins à la chienne gestante

### Mesures de précaution

Un certain nombre de mesures sont traditionnellement recommandées pour la chienne gestante :

- Pas de vaccination ou décaler la vaccination 15 jours avant ou après la gestation.
- Alimentation de bonne qualité et adaptée.
- Exercice régulier.
- La vermifugation doit être effectuée pendant les chaleurs et après la mise bas.

De façon idéale, il convient de prévoir une caisse de mise bas et d'y habituer la mère dès la dernière semaine de gestation. Elle doit être située dans un endroit propre qui peut être chauffé facilement et surveillé efficacement.



# CLINIQUE VÉTÉRINAIRE

14, rue Émile-Noirot - 42300 ROANNE

☎ 04 77 71 78 93

## Surveillance de la chienne gestante

- Chute de la température rectale de 1° dans les 24h qui précèdent la mise-bas.
- Début de la lactation au cours de la dernière semaine de gestation : c'est un signe peu précis.
- Apparition de la glaire cervicale : écoulement incolore qui précède immédiatement le début du travail. Il s'agit du signe le plus tardif.

## **Dérroulement de la mise bas :**

### Phase préparatoire :

La chienne est inquiète, agitée, recherche un endroit calme. Les premières contractions se produisent de manière intermittente, il n'y a pas d'efforts volontaires.

### Phase d'expulsion :

Les contractions utérines et abdominales durent moins de 24 heures. La mise bas du premier chiot est souvent la plus longue, mais il ne doit pas s'écouler plus d'une heure entre la perte des eaux, de couleur verte, et la naissance du premier chiot.

Le délai entre 2 naissances varie de 10 à 60 minutes.

Les chiots peuvent se présenter par l'avant ou par l'arrière. Un nœud doit être fait au niveau du cordon ombilical avant de séparer le chiot du placenta.

### Phase d'élimination des membranes fœtales :

Quelques minutes après la naissance d'un chiot, le placenta est expulsé. Des lochies (écoulement verdâtres) accompagnent chaque séparation placentaire

## **Problème nécessitant d'appeler le vétérinaire**

- Efforts sans expulsion d'un chiot pendant plus de 30 minutes
- Délai entre 2 naissances supérieur à 2 heures
- Contractions depuis plus de 12 heures
- Liquide purulent, odeur nauséabonde.

## Surveillance après la naissance

Il ne faut pas laisser la femelle consommer les placentas car ils ne sont d'aucun bénéfice et peuvent même être à l'origine d'une gastro-entérite.